

# জাতীয় টিকাকরণ কর্মসূচী

টিকার নাম	টিকাকরণের সময়	ডোজ/মাত্রা	প্রয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োগ স্থল
<b>গর্ভবতী মহিলাদের জন্য:</b>				
টিটি-১	গর্ভাবস্থার শুরুতে	০.৫ মিলি	ইন্ট্রামাসকুলার <sup>১</sup>	বাহুর উপরিভাগ
টিটি-২	টিটি-১ দেওয়ার চার সপ্তাহ পরে*	০.৫ মিলি	ইন্ট্রামাসকুলার <sup>১</sup>	বাহুর উপরিভাগ
টিটি বুস্টার	গত ৩ বছরের মধ্যে গর্ভাবস্থায় দুটি টিটি নিয়ে থাকলে**	০.৫ মিলি	ইন্ট্রামাসকুলার <sup>১</sup>	বাহুর উপরিভাগ
<b>ইনফ্যান্টদের জন্য:</b>				
বিসিজি	জন্মের সময় থেকে ১ বছরের মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব	০.১ মিলি (০.০৫ মিলি, ১ মাস বয়স পর্যন্ত)	ইন্ট্রাডার্মাল <sup>২</sup>	বাম বাহুর উপরিভাগ
হেপাটাইটিস বি	জন্মের সময় থেকে (বা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব) ২৪ ঘণ্টার মধ্যে	০.৫ মিলি	ইন্ট্রামাসকুলার <sup>১</sup>	বাম উরুর মাঝামাঝি সামনে ও বাইরের দিকে
ওপিভি-০	জন্মের সময় থেকে (বা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব) ১৫ দিনের মধ্যে	২ ফোঁটা	মুখে খাওয়ানো	মুখে
ওপিভি-১, ২ ও ৩	৬, ১০ ও ১৪ সপ্তাহ থেকে অনূর্ধ্ব ৫ বছর	২ ফোঁটা	মুখে খাওয়ানো	মুখে
পেন্টাভ্যালেন্ট-১, ২ ও ৩	৬, ১০ ও ১৪ সপ্তাহ থেকে অনূর্ধ্ব ১ বছর	০.৫ মিলি	ইন্ট্রামাসকুলার <sup>১</sup>	বাম উরুর মাঝামাঝি, সামনে ও বাইরের দিকে
রোটাইনাইটস	৬, ১০ ও ১৪ সপ্তাহ থেকে অনূর্ধ্ব ১ বছর	৫ ফোঁটা	মুখে খাওয়ানো	মুখে
আইপিভি	৬ ও ১৪ সপ্তাহ থেকে অনূর্ধ্ব ১ বছর	০.১ মিলি	ইন্ট্রাডার্মাল <sup>২</sup>	ডান বাহুর উপরিভাগ
নিউমোককাল	৬ ও ১৪ সপ্তাহ থেকে অনূর্ধ্ব ১ বছর	০.৫ মিলি	ইন্ট্রামাসকুলার <sup>১</sup>	ডান উরুর মাঝামাঝি, সামনে ও বাইরের দিকে
হাম/এমআর ১ম ডোজ	৯-১২ মাস, অনূর্ধ্ব ৫ বছর	০.৫ মিলি	সাবকিউটেনাস <sup>৩</sup>	ডান বাহুর উপরিভাগ
নিউমোককাল বুস্টার	৯ মাস পূর্ণ হলে	০.৫ মিলি	ইন্ট্রামাসকুলার <sup>১</sup>	ডান উরুর মাঝামাঝি, সামনে ও বাইরের দিকে
জাপানিজ এনফেলাইটিস-১ম ডোজ	৯-১২ মাস, অনূর্ধ্ব ৫ বছর	০.৫ মিলি	সাবকিউটেনাস <sup>৩</sup>	বাম বাহুর উপরিভাগ
ভিটামিন-এ ১ম ডোজ	৯ মাস থেকে অনূর্ধ্ব ৫ বছর	১ মিলি	মুখে খাওয়ানো	মুখে
<b>শিশুদের জন্য:</b>				
ডিপিটি বুস্টার ১ম ডোজ	১৬-২৪ মাস	০.৫ মিলি	ইন্ট্রামাসকুলার <sup>১</sup>	বাম উরুর মাঝামাঝি সামনে ও বাইরের দিকে
হাম/এম আর ২য় ডোজ	১৬-২৪ মাস	০.৫ মিলি	সাবকিউটেনাস <sup>৩</sup>	ডান বাহুর উপরিভাগ
ওপিভি বুস্টার	১৬-২৪ মাস অনূর্ধ্ব ৫ বছর	২ ফোঁটা	মুখে খাওয়ানো	মুখে
জেই-২য় ডোজ	১৬-২৪ মাস	০.৫ মিলি	সাবকিউটেনাস <sup>৩</sup>	বাম বাহুর উপরিভাগ
ভিটামিন-এ (২য়-৯ম ডোজ)	১৬ মাস তারপর প্রতি ৬ মাসে একটি ডোজ অনূর্ধ্ব ৫ বছর	২ মিলি	মুখে খাওয়ানো	মুখে
ডিপিটি বুস্টার ২ ডোজ	৫-৬ বছর অনূর্ধ্ব ৭ বছর	০.৫ মিলি	ইন্ট্রামাসকুলার <sup>১</sup>	বাম বাহুর উপরিভাগ
টিটি	১০ বছর	০.৫ মিলি	ইন্ট্রামাসকুলার <sup>১</sup>	বাহুর উপরিভাগ
টিটি	১৬ বছর	০.৫ মিলি	ইন্ট্রামাসকুলার <sup>১</sup>	বাহুর উপরিভাগ

\*টিটি-২ বা বুস্টার ডোজ গর্ভাবস্থার ৩৬ সপ্তাহের মধ্যে দেবেন। তবে যদি ৩৬ সপ্তাহ পার হয়েও যায় তাহলেও কোন মা বাচ্চা জন্মানোর সময় এলে তাঁকেও টিটি দিয়ে দিন।

\*\*\*ভিটামিন এ'র ২য় থেকে ৯ম মাত্রা ১-৫ বছর বয়সী শিশুদের বছরে দুবার ভিটামিন এ রাউন্ড-এর সময় খাওয়ানো হয়। এতে আইসিডিএস-এর কর্মীরা সাহায্য করেন।

#নির্দিষ্ট কিছু রাজ্য/জেলায়।

১ ইন্ট্রামাসকুলার (পেশীর ভিতরে)

২ ইন্ট্রাডার্মাল (চামড়ার ঠিক তলায়)

৩ সাবকিউটেনাস (চামড়ার নীচে)